

Image historique : aquarelle Lyonnaise n°3

L'histoire étonnante de ces aquarelles originales datant de la fin du 19^{ième} / début du 20^{ième} siècle, époque à laquelle les dermatoses étaient peintes, vous est comtée avec la première.

Voici donc la troisième, sans diagnostic, non datée et dont la signature en bas à gauche est différente des 2 précédentes par F. Verni. Cette vaste ulcération du dos de la main, étendue à l'avant-bras, à bordure papuleuse peut faire évoquer plusieurs diagnostics. Le Pr. Berbis et moi vous en proposons trois : tuberculose, syphilis et *pyoderma gangrenosum*, hypothèse que nous privilégions, ce d'autant qu'il nous semble voir quelques éléments qui pourraient correspondre à des pustules en périphérie...

Le *pyoderma gangrenosum*, a été initialement appelé « pyodermite phagédénique » par les auteurs français qui l'ont décrit (*Cf infra*). C'est une dermatose réactionnelle auto-inflammatoire classée parmi les dermatoses neutrophiliques, qui peut révéler une maladie générale (digestive, rhumatismale, hématologique, endocrinienne...) dans 50% des cas, ce qui en fait une dermatose de grand intérêt pour le dermatologue, malgré sa rareté.

Pr. E. Delaporte

[Phagedenic pyodermitis in rheumatoid polyarthritis].

Thiers H, Moulin G, Odelin MF.

Lyon Med. 1969 Apr 20;221(16):957-9.

PMID: 5398698 French. No abstract available.

[Phagedenic pyodermitis with dysglobulinemia].

Degos R, Touraine R, Danon, Lauret P, Rigolet D, Debat M, Zilberman J.

Bull Soc Fr Dermatol Syphiligr. 1966 Jul-Aug;73(4):370-3.

PMID: 5963655 French. No abstract available.



Collection Pr. E. Delaporte